

## COBACTIN 500 W.S.P.

### โคแบคติน 500 ชนิดผงละลายน้ำ

**ส่วนประกอบ** ใน 1 กิโลกรัม ประกอบด้วย

Colistin sulfate equivalent to Colistin 500 กรัม

**สรรพคุณ** โคลิสตินเป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้โดยเฉพาะแบคทีเรียแกรมลบ เช่น อี.โคไล (*E.coli*), ซัลโมเนลล่า (*Salmonella sp.*), วิบริโอ (*Vibrio sp.*), บอร์เดเทลล่า (*Bordetella sp.*), ชิเจลล่า (*Shigella sp.*), พิวโดโมนาส (*Pseudomonas sp.*) เป็นต้น

**ขนาดและวิธีใช้**

1. สัตว์ปีก ให้ยาโคลิสติน ขนาด 100,000 IU ต่อน้ำหนักตัวสัตว์หนึ่งกิโลกรัมต่อวัน (หรือเท่ากับ 3.33 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัวสัตว์หนึ่งกิโลกรัมต่อวัน) หรือให้ยาโคแบคติน 500 ชนิดผงละลายน้ำ ขนาด 6.66 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์หนึ่งกิโลกรัมต่อวัน โดยละลายน้ำให้กินติดต่อกัน 5 - 10 วัน น้ำที่ผสมยาแล้วควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง
2. สุกร ให้ยาโคลิสติน ขนาด 100,000 IU ต่อน้ำหนักตัวสัตว์หนึ่งกิโลกรัมต่อวัน (หรือเท่ากับ 3.33 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์หนึ่งกิโลกรัมต่อวัน) หรือให้ยาโคแบคติน 500 ชนิดผงละลายน้ำ ขนาด 6.66 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์หนึ่งกิโลกรัมต่อวัน โดยละลายน้ำให้กินติดต่อกัน 5 - 10 วัน น้ำที่ผสมยาแล้วควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง

**ผลิตโดย**

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์มา จำกัด

**ผู้แทนจำหน่าย**

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์มา จำกัด